

预,但随着该种护理模式在临床的推广与应用,逐渐发现,以往常规护理模式侧重于疾病的护理,不仅不注重一些细小环节的护理,而且还严重缺乏对高龄患者生理与心理多方面护理干预,因而其最终护理效果较差。为此,有研究提出^[10]可尝试给予高龄人工髋关节置换术患者以围术期麻醉综合护理干预。

本次研究中通过给予我院收治的高龄人工髋关节置换术患者采用围术期麻醉护理干预后的结果显示:患者仅出现 1 例并发症现象,经过相关治疗干预后无碍;患者的护理满意度为 94.29%,相比普通的临床护理措施,麻醉护理干预的应用效果显著,2 组对比($P < 0.05$)。除此之外,观察组患者在术后髋关节活动度、髋关节畸形改善及髋关节疼痛恢复等总评分方面,均较对照组高,2 组相比较($P < 0.05$)。围术期麻醉护理主要是指由本院具有丰富经验的护理人员分别在患者实施麻醉前、麻醉中、麻醉后给予针对性的护理干预措施;麻醉前通过心理护理、饮食护理、肺功能护理等;麻醉过程中通过有效评估和排除患者的相关麻醉禁忌证,使患者保持积极向上的心理状态,关注其生命体征及保暖情况护理;麻醉后通过一般护理、及时告知患者手术结果、专科护理以及并发症预防等护理,来保障患者人工髋关节置换术疗效及其预后质量,使患者术后髋关节能够尽快康复,提升患者对临床护理工作的满意度。

综上研究分析所述,围术期麻醉护理在人工髋关节置换术中应用效果显著,不仅可以有效降低高龄人工髋关节置换术患者的术后并发症发生率,还可促进患者术后髋关节功能的良好恢复,同时还对患者护理满意度也有着重要评价认可的意义。

建议今后临床中推广以及应用。

参考文献

- [1] 程晓妹,殷婷,李永梅. 高龄患者人工髋关节置换术围术期的护理体会[J]. 中西医结合护理(中英文),2018,4(2):137-139.
- [2] 李昕,王巍,张舒,等. 70 例老年人工髋关节置换术的围术期护理[J]. 中国伤残医学,2018,26(9):65-66.
- [3] 夏林智,杨晶晶,雷震,等. 围术期预防性使用洛伐他汀对老年半髋关节置换术患者的影响[J]. 广东医学,2019,40(22):113-116.
- [4] 肖娜. 探讨快速康复理念在老年人工髋关节置换术患者围术期护理中的效果[J]. 中国实用医药,2019,14(16):180-181.
- [5] 邓珍良,袁丽娟,刘雪琼. 快速康复护理在髋关节置换围术期患者中的应用[J]. 卫生职业教育,2018,36(23):151-153.
- [6] 何燕军. 老年髋关节置换术患者在腰硬联合麻醉下配合麻醉护理降低麻醉风险的积极作用[J]. 中外医疗,2021,40(18):4.
- [7] 李秀艳. 围术期护理对高龄股骨颈骨折患者行人工髋关节置换术的临床效果及预后评价[J]. 中国医药指南,2021,19(16):2.
- [8] 廖晓红. 老年人工髋关节置换术围术期麻醉护理分析[J]. 透析与人工器官,2021,32(2):3.
- [9] 郑君翠,张碧兰,王月. 手术室全方位舒适护理对髋关节置换术患者心理状态及心率的影响[J]. 黑龙江医学,2021,45(8):3.
- [10] 晁会,涂淑敏,邢雪燕,等. 预见性护理在髋关节置换手术麻醉护理中的应用及对炎症反应的影响[J]. 国际护理学杂志,2021,40(9):4.

收稿日期:2020-10-16

·录用稿件补充说明·

录用稿件补充说明

根据期刊主管部门要求,本刊至 2021 年 10 月起录用论文在原论文录用要求下,补充以下几点:1. 论文选题范围严格限定伤残医学内容;2. 论文正文字数在 6000 字符以上(不包括中英文摘要、图、表及参考文献);3. 参考文献在 10 条以上并同正文角码一致;4. 论文必须有结构式摘要和关键词(3 个以上),最好有同论文题目、作者、单位、摘要和关键词一致的英文部分。